

Cím: Csípőízületi TEP revíziójához vezető út képalkotói szemmel.

Intézmény: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - Radiológiai Osztály

Előadó: Kiss Elvira (bneelvira@gmail.com)

Összefoglalás/ Abstract

A vizsgálat célja bemutatni, hogy mely képalkotói eljárásoknak van szerepük a teljes csípő protézis kilazulásának felismerésében. Kitűzött cél az esetek alapján felismerni azokat a rizikófaktorokat, melyek a protézis kilazulásához vezethetnek, illetve felmérni, hogy a congenitalis csípőficamok hajlamosítanak-e a TEP kilazulására.

Kutatási módszerem lényege a 2014-től 2016-ig előfordult esetekhez kapcsolódó kórlapok és egyéb egészségügyi dokumentáció áttanulmányozása és az így nyert adatok elemzése.

Eredmények: A vizsgált 92 eset 75%-át nők teszik ki. A női betegek 50%-a szenvedett klinikailag igazolt osteoporosisban, míg a vizsgált férfiak esetében osteoporosis csak 17%-os arányban volt jelen. Testsúly tekintetében a BMI vagy TTI számítások alapján a női páciensek 32%-a és a férfiak 10%-a elhízott. A talált esetek 59,8%-át konvencionális radiológiai felvételek alapján, míg a fennmaradó 40,2%-át izotóp vizsgálatok alapján diagnosztizálták. A vizsgált 92 esetből 19 nőnél és 3 férfi beteg kórtörténetében szerepelt a veleszületett csípőficam (24%). Így a minta reprezentatívnak tekinthető, de látható, hogy az egyéb tényezők miatti TEP kilazulás nagyobb gyakoriságot mutat.

Következtetések, javaslatok: a nők körében a TEP kilazulás háromszor gyakrabban fordul elő, mint a férfiak esetében. Az osteoporosis és az elhízás egyaránt hajlamosító tényezők. A képalkotó módszerek közül a hagyományos röntgen technika és az izotóp diagnosztika egymást kiegészítik. Ezek alapján javasoljuk a rendszeres kontroll képalkotó vizsgálatokat, melyek a diagnózis korai felállításával a terápiás lehetőségeket jelentősen befolyásolhatják, illetve preventív céllal kiemelten fontos a betegeket időben helyes életviteli tanácsokkal ellátni.